



ВНИМАНИЕ!



ОПАСНЫЙ КАРАНТИННЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ - КОРИЧНЕВО-МРАМОРНЫЙ КЛОП




Тело коричнево-мраморного клопа овальной формы. Цвет тела светлый с густыми темными пятнами и отдельными точками, что дает общий коричневый фон.

Весной взрослые клопы выходят из укрытий, начинают питаться, спариваются и откладывают яйца. Развитие клопа от яйца до взрослого состояния занимает 1,5 - 2 месяца в зависимости от климата и погодных условий. Осенью взрослые клопы уходят на зимовку в поверхностные слои почвы, в подстилку под опавшей листвой, в дернину, в помещения (склады, сараи, гаражи, навесы, балконы, хозяйственные постройки).

Коричнево-мраморный клоп повреждает множество растений: груша, яблоня, персик, абрикос, черешня, виноград, облепиха, лещина, томат, огурец, перец, баклажан, фасоль, соя, горох, нут, кукуруза, пшеница, ячмень, тюльпаны, розы, гибискус, клен, ясень и др.

На плодовых и овощных культурах вредитель повреждает плоды, на цветочных и декоративных растениях – молодые побеги и бутоны цветков, на виноградниках – молодые побеги и ягоды. При отсутствии мероприятий по борьбе потери товарного урожая, например, косточковых, семечковых, цитрусовых культур, винограда, овощей, кукурузы и др., составляют до 60-90%. Расселение коричнево-мраморного клопа может происходить как с сельскохозяйственной продукцией (фрукты, овощи, зеленные культуры, срезка цветов, облиственные растения в контейнерах и др.), так и с ручной кладью и багажом, несельскохозяйственными (промышленными) грузами и транспортными средствами.



Меры борьбы. Наиболее эффективно применение комплекса методов.

Химические средства защиты. Это инсектициды, разрешенные к применению на территории Российской Федерации для соответствующих культур (применяются согласно инструкции производителя).

Биологические методы защиты и выявления. Весной рекомендуется использование феромонных ловушек типа клеевых пластин, в летне-осенний период – накопительные ловушки, например, пирамидальную ловушку.

Механические способы. Весной, когда клопы массово выходят из мест зимовки, эффективен ручной сбор с последующим уничтожением насекомых. Одновременно необходимо осматривать растения на наличие кладок яиц клопа, которые обычно располагаются на нижней стороне листа. Выявленные кладки яиц уничтожают.

С конца осени и до весны целесообразно проводить регулярный осмотр возможных укрытий клопа – различных помещений. Можно изготовить ловушки из небольших картонных коробок, заполненных смятым картоном или бумагой. Ловушки с клопами подлежат уничтожению путем сжигания.

ВЫЯВЛЯЙТЕ ОПАСНОГО ВРЕДИТЕЛЯ - КОРИЧНЕВО-МРАМОРНОГО КЛОПА ДЛЯ СВОЕВРЕМЕННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ЕГО ОЧАГОВ!

